

如何確保正確的劑量，防止用藥失誤

切開藥片是一種在香港常見的用藥方法。在確保病人每次服用適當劑量的情況下將整片藥片吞服是最安全及準確的方法。但在有些時候，將藥片切開吞服仍然是必須的。

切開藥片的原因

- 提高藥物劑量的彈性：
如病人所需服用的劑量不是整片劑量，便可用分片方法。
- 降低成本：
把昂貴的藥片劑量減半，價格成本是會小於相同劑量的藥物。
- 方便病人易於吞服較大粒的藥物。



切開藥片的缺點

美國食品和藥物管理局（FDA）探討了分片的缺點如下：

混亂正確的劑量

患者可能已購買全片劑量，卻忘記分裂藥片，造成意外過量服用藥物。

分配不均的劑量

研究結果顯示，被分為半片的活性成份藥片，於每半片的成份含量可能會不同。

藥片可能難以分割

橢圓形或不規則形狀的藥片可能令他們難以均勻地分割。此外，體積細小的藥片可能在被分割的時候，更容易破碎。

藥片可能難以分割

橢圓形或不規則形狀的藥片可能令他們難以均勻地分割。此外，體積細小的藥片可能在被分割的時候，更容易破碎。

不是所有的藥物可以安全地被分割。


某些藥物，如膠囊，長效配方的藥物，或那些有薄膜包衣藥片應該全片服用。如果你不能確定你的藥物是否可以分片服用，請諮詢藥劑師。

分割藥片的困難

某些病人，如老人，視力不佳病人，關節炎患者，帕金森氏症患者，或那些手部不協調的患者，有可能會在分割藥片時，遇到困難。

不應切開的藥物

- 膠囊或含有液體的膠囊。
- 藥片於舌頭頂端或舌頭下面含服。
- 控釋，緩釋及腸溶藥物。
- 治療劑量範圍狹窄的藥物。



切開藥片的最佳做法

- 使用平板分離器。不要使用家用物品，如菜刀或您自己的牙齒。
- 不要切開整個供應藥片，並將其儲存以備用。確保在切開更多藥片之前，服用完之前被切開的藥片。
- 切開藥片可能會受到外部因素，如熱度和/或濕度，而導致藥物的穩定性改變。
- 分數線沿線切開片劑。雖然醫護人員建議沿線切開藥片，但不保證劑量可以均勻地減少一半，但仍然給予藥物一致性。
- 如果可能，避免切開小的藥片，因為它們更容易破碎成更小的碎片。



明心醫務中心
ActiveCareMedics

九龍尖沙咀加拿分道46號地下底層8號舖（地鐵站B出口）
電話：2311 2838 傳真：3020 8797
電郵：ACM@ActiveCareGroup.com
網址：http://www.ActiveCareGroup.com